




PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
(CASA JUVENAL LÚCIO DE SOUSA)
GABINETE DA VEREADORA
NADIGERLANE RODRIGUES (NADIRO)

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO

Em, 05 / 11 / 2024 às 19:04 horas


Presidente



Processo REPL 1102/2024 - Data 05/11/2024 - Hora
09:13:54 Assunto: SOLICITO DO SENHOR PREFEITO
NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO, A
IMPLANTAÇÃO DOS EXAMES DE PROTEINÚRIA DE 24
HORAS E TOTG NO LABORATORIO MUNICIPAL DE
NOSSA CIDADE.

Remetente: NADIGERLANE RODRIGUES DE C. A. GUEDES
()

**SOLICITO DO SENHOR PREFEITO
NABOR WANDERLEY DA NOBREGA
FILHO, A IMPLANTAÇÃO DOS EXAMES
DE PROTEINÚRIA DE 24 HORAS E TOTG
NO LABORATORIO MUNICIPAL DE
NOSSA CIDADE**

SENHORA PRESIDENTA:

Na Forma Regimental, após consultado o Plenário, requeiro de Vossa Excelência, que seja encaminhado por meio de ofício, veemente apelo ao Senhor Prefeito Nabor Wanderley da Nobrega Filho, a implantação dos Exames de **PROTEINÚRIA DE 24 HORAS e TOTG** no Laboratório Municipal de nossa cidade.

JUSTIFICATIVA:

A proposição se justifica, é necessário para o atendimento da presente solicitação, **Proteinúria** é uma condição caracterizada pela presença de proteínas na urina, em uma quantidade superior ao normal.

Está usualmente associada a algum tipo de doença ou anormalidade, mas, ocasionalmente, pode ser observada em adultos normais.

Os pacientes com **proteinúria** também devem ter o sedimento urinário avaliado, procurando sinais de glomerulopatias como hematúria, dismorfismo eritrocitário, cilindros hemáticos ou lipidúria

A presença de **proteínas na urina** em excesso é conhecida cientificamente por proteinúria e pode ser indicativa de alterações renais, hipertensão arterial ou diabetes.

O Exame TOTG é fundamental para as grávidas, pois permite que seja verificado o risco de diabetes gestacional.


Se a primeira consulta de pré-natal for realizada entre 20 e 28 semanas gestacionais, o exame recomendado é o **TOTG**, entre 24 e 28 semanas de gestação. Contudo, se a primeira consulta ocorrer após 28 semanas gestacionais, o teste deve ser feito imediatamente.

Gestantes com glicemias inferiores a 92 mg/dL devem ser submetidas ao teste de tolerância oral à glicose (TOTG) entre 24 e 28 semanas gestacionais.

As dosagens precisam ser feitas em jejum e aos 60 e 120 minutos após a ingestão de 75 g de glicose.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente o pleito atendido.

**SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB.
CASA JUVENAL LÚCIO DE SOUSA. Em, 05 de Novembro de 2024.**


Nadigerlane Rodrigues de Carvalho Almeida Guedes

Vereadora/autora